



Галавит®, 50 мг, суппозитории ректальные

Действующее вещество: аминодигидрофалазиндион натрия

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нём содержатся важные для Вас сведения.

- Данный лекарственный препарат является препаратом, отпускаемым без рецепта.
- Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его ещё раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или медицинской сестре. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

СОДЕРЖАНИЕ ЛИСТКА-ВКЛАДЫША

- 1 Что из себя представляет препарат Галавит и для чего его применяют.
- 2 О чём следует знать перед применением препарата Галавит.
- 3 Применение препарата Галавит.
- 4 Возможные нежелательные реакции.
- 5 Хранение препарата Галавит.
- 6 Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ГАЛАВИТ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ПРИМЕНЯЮТ

Препарат Галавит содержит действующее вещество аминодигидрофалазиндион натрия, которое относится к группе лекарственных средств, называемых: иммуностимуляторы.

Показания к применению

Препарат Галавит применяется у детей в возрасте от 6 до 12 лет в качестве иммуномодулирующего и противовоспалительного средства в комплексной терапии иммунодефицитных состояний при:



- частых рецидивирующих заболеваниях дыхательных путей и ЛОР-органов бактериальной и вирусной этиологии (частые ОРВИ, бронхит, пневмония, хронический тонзиллит, отит и аденоидит);
- профилактике гриппа и острых респираторных инфекций;
- воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта и горла, заболеваниях пародонта;
- инфекционных кишечных заболеваниях, сопровождающихся интоксикацией и/или диареей;
- лечении и профилактике урогенитальных инфекций бактериальной и вирусной этиологии;
- хронических рецидивирующих заболеваниях, вызванных вирусом герпеса;
- заболеваниях, вызванных вирусом папилломы;
- язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки;
- вирусных гепатитах;
- гнойных хирургических заболеваний (ожоговые поражения, рецидивирующий фурункулёз, хронический остеомиелит, гангренозный аппендицит с оментитом, перитонит, гнойный плеврит);
- послеоперационных гнойно-септических осложнениях и их профилактике (в том числе у онкологических больных);
- астенических состояниях, невротических и соматоформных расстройств, снижении физической работоспособности.



Способ действия препарата Галавит

Препарат Галавит регулирует активность клеток врожденного и адаптивного иммунитета, повышая устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, вызванным вирусами, бактериями и грибами. Препарат Галавит усиливает способность иммунных клеток выявлять и нейтрализовать вредные микроорганизмы. Он также повышает активность антител, регулирует выработку собственных защитных белков (интерферонов). Это ускоряет выведение возбудителей, что способствует сокращению длительности инфекций, снижает риск повторных заболеваний. Препарат Галавит, подавляя избыточное образование провоспалительных белков, контролирует воспалительный процесс, выраженность интоксикации организма. За счет этого свойства препарат Галавит способствует более раннему снижению симптомов заболевания, улучшая самочувствие с первых дней лечения.

Препарат Галавит нейтрализует агрессивные свободные радикалы, которые образуются в ходе воспаления, защищая ткани и органы от их разрушительного воздействия.

Основные эффекты наблюдаются в течение 72 часов.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О ЧЁМ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ГАЛАВИТ

Противопоказания

Не применяйте препарат Галавит:



- если у Вас аллергия на аминодигидрофалазиндион натрия или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);



- Вы беременны или кормите грудью.

Особые указания и меры предосторожности

Перед началом применения препарата Галавит проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Не превышайте указанные дозы и длительность курса лечения без консультации с лечащим врачом.



- Дети**
Не давайте препарат детям в возрасте от 0 до 6 лет вследствие вероятной небезопасности, поскольку эффективность и безопасность не установлены.

Другие препараты и препарат Галавит

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

При одновременном применении возможно снижение курсовых доз антибиотиков. Препарат Галавит позволяет повысить эффективность антибиотикотерапии и снизить её побочные эффекты.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, предполагаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Не применяйте препарат Галавит во время беременности и в период кормления грудью.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Галавит не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ГАЛАВИТ

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Доза и продолжительность применения препарата зависят от характера, тяжести и длительности заболевания.

- При частых рецидивирующих заболеваниях дыхательных путей и ЛОР-органов бактериальной и вирусной этиологии (частые ОРВИ, бронхит, пневмония, хронический тонзиллит, отит и аденоидит): по 1 суппозиторию ежедневно в течение 5 дней,

затем по 1 суппозиторию через день в течение 10 дней.

Курс – 15 суппозиториев.

- Для профилактики гриппа и острых респираторных инфекций: по 1 суппозиторию 1 раз в день. Курс – 5 суппозиториев.
- При воспалительных заболеваниях слизистой оболочки полости рта и горла, заболеваниях пародонта: начальная доза по 1 суппозиторию ежедневно – 5 суппозиториев, затем по 1 суппозиторию с интервалом 72 часа. Курс – 15 суппозиториев.
- При острых инфекционных кишечных заболеваниях, сопровождающихся диарейным синдромом: начальная доза составляет 2 суппозитория по 50 мг однократно, затем по 1 суппозиторию 2 раза в день до купирования симптомов интоксикации. Возможно последующее продолжение курса по 1 суппозиторию с интервалом 72 часа. Курс – 20 суппозиториев по 50 мг.
- При лечении и профилактике урогенитальных инфекций бактериальной и вирусной этиологии: 1 день по 1 суппозиторию 2 раза в день, затем по 1 суппозиторию через день. Курс – 10–15 суппозиториев (в зависимости от тяжести патологического процесса).
- При хронических рецидивирующих заболеваниях, вызванных вирусом герпеса: по 1 суппозиторию ежедневно в течение 5 дней, затем по 1 суппозиторию через день – 15 суппозиториев.
- При заболеваниях, вызванных вирусом папилломы: 5 дней по 1 суппозиторию 1 раз в день, затем по 1 суппозиторию через день. Курс – 20 суппозиториев.
- При язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки в остром периоде: 2 дня по 2 суппозитория 1 раз в день, затем по 1 суппозиторию с интервалом 72 часа. Курс – 15–25 суппозиториев. В хроническом периоде: 5 дней по 1 суппозиторию 1 раз в день, затем по 1 суппозиторию через 72 часа. Курс – 20 суппозиториев.
- При вирусных гепатитах: начальная доза составляет 2 суппозитория однократно, затем по 1 суппозиторию 2 раза в день до купирования симптомов интоксикации и воспаления. Последующее продолжение курса по 1 суппозиторию с интервалом 72 часа. Курс – 20 суппозиториев.
- При гнойных хирургических заболеваниях (ожоговых поражениях, рецидивирующем фурункулезе, хроническом остеомиелите, гангренозном аппендиците с оментитом, гнойном плеврите): по 1 суппозиторию ежедневно – 5 дней, затем по 1 суппозиторию через день в течение 10 дней.
- Для профилактики и лечения хирургических осложнений в до- и послеоперационном периоде (в том числе у онкологических больных): назначают по 1 суппозиторию 1 раз в день – 5 суппозиториев до операции, 5 – после операции по 1 суппозиторию через день и 5 суппозиториев – с интервалом 72 часа. При тяжёлом течении заболевания начальная доза – 2 суппозитория однократно или 2 раза в день по 1 суппозиторию. Курс – 20 суппозиториев.
- При астенических состояниях, невротических и соматоформных расстройствах: 5 дней по 1 суппозиторию ежедневно, затем по 1 суппозиторию – через 72 часа. Курс – 15 суппозиториев. Для повышения физической работоспособности: по 1 суппозиторию через день курсом – 5 суппозиториев.

Путь и способ введения

Ректально.

Освободите суппозиторий от контурной упаковки и затем введите в прямую кишку. Предварительно рекомендуется освободить кишечник.

Если Вы применили препарата Галавит больше, чем следовало

Если Вы по ошибке применили большую дозу лекарственного препарата, чем было рекомендовано, то Вам следует незамедлительно связаться с Вашим лечащим врачом. Врач примет решение о необходимости принятия адекватных мер.

Если Вы забыли применить препарат Галавит

Если Вы пропустили применение дозы, примените следующую дозу в назначенное время. Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать дозу, которую Вы забыли применить.

Если Вы прекратили применение препарата Галавит

Во избежание ухудшения Вашего состояния не прекращайте применение лекарственного препарата Галавит самостоятельно, не проконсультировавшись с Вашим лечащим врачом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Галавит может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Редко (могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000):

- аллергические реакции.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в этом листке-вкладыше.

Вы также можете сообщить о любых нежелательных реакциях напрямую через систему сообщений государств – членов Евразийского экономического союза (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Телефон: +7 (800) 550-99-03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт: <https://www.roszdravnadzor.gov.ru>

5. ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ГАЛАВИТ

Храните препарат в недоступном для детей месте. Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на картонной пачке после «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С в защищённом от света месте.

Не выбрасывайте препарат в канализацию.

Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препараты, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Препарат Галавит содержит

Действующим веществом является аминодигидрофалазиндион натрия. Каждый суппозиторий содержит 50 мг аминодигидрофалазиндион натрия. Вспомогательными веществами являются: жирных кислот глицериды (витепсол W-35 и витепсол H-15).

Внешний вид препарата Галавит и содержимое упаковки

Суппозитории ректальные.

Суппозитории от белого до белого с желтоватым оттенком цвета, торпедообразной формы без видимых вкраплений на продольном срезе. По 5 суппозиториев в контурную ячейковую упаковку. По 1, 2, 3 или 4 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в пачку из картона.

Категория отпуска лекарственного препарата

Лекарственный препарат относится к категории отпуска без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация
ООО «Сэлвим»
123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, 5А, офис 91
Тел: 8 (800) 707-71-81
E-mail: safety@salvim.ru

Производитель

Производитель
Российская Федерация
ООО «Сэлвим»
308013, Белгородская обл., г.о. город Белгород, г. Белгород, ул. Рабочая, д. 14/2, помещ. 2
Или
ООО «Альтфарм»
142073, Московская обл., г. Домодедово, д. Судаково, тер. Лесное, стр. 106

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения:

Российская Федерация
ООО «Сэлвим»
123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик, 5А, офис 91
Тел: 8 (800) 707-71-81
E-mail: safety@salvim.ru

Листок-вкладыш пересмотрен:

Прочие источники информации

Подробные сведения о препарате содержатся в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза.